### **Laser and Synchrotron Research Center**

極限コヒーレント光科学研究センター (LASOR) では、 超精密レーザーや極短パルス、大強度レーザーなどの 極限的なレーザーおよび、シンクロトロン放射光を用い た先端的軟 X 線ビームラインを開発している。 テラヘル ツから真空紫外線、軟 X 線までの広いエネルギー範囲 の光源を用いて、極限的な光と物質との相互作用の研 究を行っている。特に、超高時間分解分光、超精密分光、 超高分解能光電子分光、スピン偏極分光、顕微分光、 回折や光散乱、イメージング、発光分光などの新しい最 先端分光計測の開発をしている。また、これらの極限的 な光源や分光手法を用いて半導体、強相関物質、有 機物質、生体物質、表面、界面などの幅広い基礎物 性研究とともに、レーザー加工など、実社会が求めてい る学理の探求や協調領域の創出を行っている。LASOR センターは、先端的な光科学とそれを用いた物質科学と の共同研究、共同利用を目指す総合的なセンターである。 柏キャンパスにおいては、大規模なクリーンルームと除振 床を設置した先端分光実験棟(D棟)及び、真空紫 外・軟 X 線レーザーの物性研究利用を主目的とした極 限光科学棟 (E棟) を有する。兵庫県にある SPring-8 においてはシンクロトロン放射光を用いたビームライン BL07LSU において軟 X 線分光の研究を行っている。

Laser and Synchrotron Research (LASOR) Center develops new lasers with extreme performance of ultraprecise, high intensity and ultra-short pulse lasers. The cutting edge soft X-ray beamline is also developed using synchrotron radiation. LASOR center is responsible for the advanced spectroscopy, such as ultra-high resolution photoemission, time-resolved, spin-resolved spectroscopy, diffraction, light scattering, imaging, microscopy and fluorescence spectroscopy, by new coherent light sources based on laser and synchrotron technology over a wide spectrum range from terahertz to X-ray. In LASOR center, a variety of materials sciences for semiconductors, strongly-correlated materials, molecular materials, surface and interfaces, and bio-materials are studied as well as industrial science such as laser processing using advanced light sources and advanced spectroscopy. The aim of LASOR center is synthetic science for photon sciences and collaborations with materials science. Most of the research activities on the development of new lasers with an extreme performance and the application to material science are studied in specially designed buildings D and E with large clean rooms and the isolated floor in Kashiwa Campus. On the other hand, the experiments utilizing the synchrotron radiation are performed at beamline BL07LSU in SPring-8 (Hyogo).

Project Researcher SAKURAGI, Shunsuke Project Researcher YAWO, Hiromu

学振特別研究員 ツァン

JSPS Research Fellow ZHANG, Pena

教 授(センター長)	小林 洋平	助 教	矢治 光一郎	技術専門職員	橋本 光博	特任研究員	谷内 敏之
Professor (Director)	KOBAYASHI, Yohei	Research Associate	YAJI, Koichiro	Technical Associate	HASHIMOTO, Mitsuhiro	Project Researcher	TANIUCHI, Toshiyuki
教授(副センター長)	原田 慈久	助 教	石井 順久	技術専門職員	工藤 博文	特任研究員	張 文雄
Professor (Deputy Director)	HARADA, Yoshihisa	Research Associate	ISHII, Nobuhisa	Technical Associate	KUDO, Hirofumi	Project Researcher	ZHANG, Wentiong
教 授 <sup>*1</sup>	小森 文夫	助 教	宮脇 淳	技術専門職員	伊藤 功	特任研究員	中里 智治
Professor (Deputy Director)	KOMORI, Fumio	Research Associate	MIYAWAKI, Jun	Technical Associate	ITO, Isao	Project Researcher	NAKAZATO, Tomoharu
教授(副センター長)*2	秋山 英文	助 教	谷 峻太郎	学術支援職員	福島 昭子	特任研究員	バレイユ セドリック
Professor (Deputy Director)	AKIYAMA, Hidefum	i Research Associate	TANI, Shuntaro	Technical Associate	FUKUSHIMA, Akiko	Project Researcher	BAREILLE, Cedric
准教授	松田 巌	助 教	平田 靖透	研究支援推進員	藤澤 正美	特任研究員	松田 拓也
Associate Professor	MATSUDA, Iwao	Research Associate	HIRATA, Yasuyuki	Technical Staff	FUJISAWA, Masami	Project Researcher	MATSUDA, Takuya
准教授	板谷 治郎	助 教	黒田 健太	特任研究員	赤田 圭史	特任研究員	山神 光平
Associate Professor	ITATANI, Jiro	Research Associate	KURODA, Kenta	Project Researcher	AKADA, Keishi	Project Researcher	YAMAGAMI, Kohei
准教授	近藤 猛	助 教	神田 夏輝	特任研究員	伊藤 紳二	特任研究員	山添 康介
Associate Professor	KONDO, Takeshi	Research Associate	KANDA, Natsuki	Project Researcher	ITO, Shinji	Project Researcher	YAMAZOE, Kosuke
准教授	松永 隆佑	助教 <sup>*2</sup>	挾間 優治	特任研究員	エル ムサウイ スリマン	特任研究員 *2	薄倉 淳子
Associate Professor	MATSUNAGA, Ryusu	ke Research Associate	HAZAMA, Yuji	Project Researcher	EL Moussaoui, Souliman	Project Researcher	USUKURA, Junko
准教授	岡﨑 浩三	助教 <sup>*2</sup>	永田 崇	特任研究員	大平 猛	特任研究員 *2	金 昌秀
Associate Professor	OKAZAKI, Kozo	Research Associate	NAGATA, Takashi	Project Researcher	OHDAIRA,Takeshi	Project Researcher	KIM, Changsu
准教授 <sup>*2</sup>	井上 圭一	特任助教	水野 智也	特任研究員	尾嶋 正治	特任研究員 *2	陶 仁春
Associate Professor	INOUE, Keiichi	Project Research Associate	MIZUNO, Tomoya	Project Researcher	OSHIMA, Masaharu	Project Researcher	TAO, Renchunu
准教授(客員)	新部 正人	技術専門員	原沢 あゆみ	特任研究員	倉橋 直也	特任研究員 *2	中前 秀一
Visiting Associate Professor	NIIBE, Masahito	Technical Associate	HARASAWA, Ayumi	Project Researcher	KURAHASHI, Naoya	Project Researcher	NAKAMAE, Hidekazu
助 教	山本 達	技術専門職員	澁谷 孝	特任研究員	小菅 淳	特任研究員 *2	中村 孝宏
Research Associate	YAMAMOTO, Susum	」 Technical Associate	SHIBUYA, Takashi	Project Researcher	KOSUGE, Atsushi	Project Researcher	NAKAMURA, Takahiro
助教	石田 行章	技術専門職員	金井 輝人	特任研究員	櫻木 俊輔	特任研究員 *2	八尾 寛

<sup>\*1</sup> 所内兼務。本務はナノスケール物性研究部門。/concurrent with Division of Nanoscale Science

Technical Associate KANAI, Teruto

ISHIDA, Yukiaki

Research Associate

特任研究員

Project Researcher SUZUKI, Takeshi


<sup>\*2</sup> 所内兼務。本務は機能物性研究グループ。/concurrent with Functional Materials Group

 $https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/\\ labs/kobayashi\_group.html$ 

## 小林研究室

Kobayashi Group

最先端レーザーの研究開発とそれを用いた精密・高強度 光科学の研究を行っている。特に超短パルスレーザーと超 狭帯域レーザーとの融合領域である光周波数コムおよびそ の応用手法の開発と、ハイパワーレーザーを用いたレーザー 加工の学理の構築を中心課題としている。レーザー光源開 発は Yb ドープセラミックやファイバーの技術を基に、超高 繰り返し、超高平均パワーのレーザーシステムを近赤外、中 赤外、紫外、真空紫外の波長領域において開発している。 超高繰り返しの方向では縦モード一本ずつを分離し制御で きるフェムト秒レーザーを実現し、世界最小のカーレンズモー ド同期レーザーを保有している。高平均パワーの方向では フェムト秒レーザーをベースとした高輝度コヒーレント真空紫 外光の発生や中赤外超精密分子分光を行っている。光源応 用として光電子分光、光原子時計、天文、医療に関する研 究を行っている。またレーザー加工の素過程となる光と物質 の相互作用において、 フェムト秒からミリ秒におよぶマルチ スケールな現象が如何に繋がっているのかについて研究し、 レーザー加工の学理構築に取り組んでいる。なぜものは切 れるのか?を知りたい。



Optical frequency comb based ultra-high precision spectroscopy. The combination of ultra-high repetition-rate laser and ultra-high resolution spectrograph makes it possible to resolve each comb tooth to detect the metastable He atom.



小林 洋平 KOBAYASHI, Yohei 教授 Professor



石田 行章 ISHIDA, Yukiaki 助教 Research Associate




谷 峻太郎 TANI, Shuntaro 助教 Research Associate


We are developing advanced laser technologies and their applications. Both ultimate technologies of ultrashort pulse generations and ultra narrow-band laser generations were mixed, the optical frequency comb then was born. It opened up a new research area such as carrier-envelope-phase dependent phenomena, attosecond physics, and precision spectroscopy by using a femtosecond light source. It also realized the high-repetition and high-intensity physics. It could create wide field of applications in the physics, metrology, medical science, and astronomy.

We are developing an Yb-fiber laser-base optical frequency comb, XUV frequency comb, and high-power fiber chirped pulse amplifier system for these applications. The high-repetition-rate laser system will be applied for a calibration of a spectrograph in an observatory or an arbitrary waveform generation in an optical field, or a breath diagnosis.

In addition, we are studying the fundamental processes of laser processing and bridging the gap between them and industrial applications.



オフセットフリー 光周波数コム Offset-free optical frequency comb.



時間分解測定 Measurement of laser processing dynamics with subpicosecond time resolution.

レーザー加工過程のサブピコ秒

- 1. 超短パルスレーザーシステムの研究開発及びレーザーの超精密制御 Development and precise control of ultrashort pulse laser systems
- 2. 高繰り返しー高強度物理 High-rep rate, high-field physics
- 3. 光周波数コムの天文・医療・標準応用 Astronomical, medical, and metrological application of the optical frequency comb
- 4. レーザー加工の学理 Fundamental understanding on laser processing

Laser and Synchrotron Research Center

https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/labs/harada\_group.html

### 原田研究室

Harada Group



原田 慈久 HARADA, Yoshihisa 教授 Professor



宮脇 淳 MIYAWAKI, Jun 助教 Research Associate


当研究室では、世界最高輝度のX線源である SPring-8において、軟X線、と呼ばれる光を用いて新しい分光法を開拓し、物質の電気的、磁気的性質、光学応答を司る電子状態をその成因に遡って調べる研究を行っている。特に光散乱の一種である軟X線発光分光の将来性に着目し、モット絶縁体、新規高温超電導体等の強相関物質における素励起(結晶場励起、スピン励起、マグノン励起、電荷密度波励起、軌道波励起など)の直接観測とその成因の研究、水溶性液体、固液界面の電子状態とミクロ不均一性の観測、電池触媒の表面反応解析、光触媒反応解析のためのその場分析装置の開発、金属タンパク質の電子状態解析など、軟X線発光分光を適用しうるあらゆる物質群を研究対象としている。また基礎光学研究として次世代高輝度放射光源に向けた軟X線吸収・発光分光の超性能化のためのR&Dを行っている。




当研究室が SPring-8 の東京大学放射光アウトステーションビームライン BL07LSU で 独自に開発した 50 meV の高エネルギー分解能を持つ角度分解軟X線発光分光装置。

High energy resolution soft X-ray angle resolved emission spectrometer constructed for University of Tokyo outstation beamline BL07LSU in SPring-8.

We explore the origin of the electronic structure of materials responsible for their electronic, magnetic and optical property using intense and energy tunable X-ray source: SPring-8, one of the most brilliant synchrotron facilities in the world. We have developed novel spectroscopies for material science in 'soft' X-ray region. We are leading the world's soft X-ray emission spectroscopy, a kind of light scattering promising for electronic structure analyses of liquids and operando spectroscopy of a variety of catalysts. Our topics include study on elementary excitations (crystal field excitation, spinon, magnon, charge density wave, orbiton etc.) in strongly correlated materials like Mott insulators and novel high-Tc superconductors, electronic structure analysis of aqueous solutions, interaction at solidliquid interfaces, surface reaction of fuel cell catalysts, electronic structure analysis of reaction center in metalloproteins, electrochemical and photocatalytic reactions. We also explore basic study on high performance soft X-ray absorption and emission spectroscopy for the next generation synchrotron light source.





Electronic structure of  $\rm H_2O$  water in a polymer electrolyte brush observed by high energy resolution soft X-ray emission spectrometer. The X-ray emission profile is similar to crystalline ice  $\rm I_h$  except for the  $\rm 3a_1$  derived state, indicating an ordered but uniformly distorted hydrogen bond network of water in the brush like ice even at room temperature. The distortion is induced by a local electric field present in the polymer brush.

- 1. 水溶性液体の電子状態とミクロ不均一性、固液界面の相互作用に関する研究 Electronic structure analysis of aqueous solutions to study microheterogeneity and interaction at solid-liquid interfaces
- 2. 燃料電池触媒の表面反応解析、電気化学反応、光触媒反応解析、金属タンパク質の機能解析のためのその場分析手法の開発 Development of in situ soft X-ray spectroscopy for surface reaction of fuel cell catalysts, electrochemical reaction, photocatalytic reaction and functionality of metalloproteins
- 3. モット絶縁体、新規高温超電導体等の強相関物質における素励起(結晶場励起、スピン励起、マグノン励起、電荷密度波励起、軌道波励起など)の直接観測とその成因の研究
  - Study on the origin and observation of elementary excitations (crystal field excitation, spinon, magnon, charge density wave, orbiton etc.) in strongly correlated materials like Mott insulators and novel high temperature superconductors.
- 4. 軟 X 線発光分光の超高エネルギー分解能化と時間分解分光のための基礎光学研究
  Basic study on ultrahigh energy resolution optics for soft X-ray emission and time-resolved spectroscopy

Laser and Synchrotron Research Center

https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/labs/i. matsuda group.htm

## 松田巌研究室

I. Matsuda Group



松田 巌 MATSUDA, Iwao 准教授 Associate Professor



山本 達 YAMAMOTO, Susumu 助教 Research Associate




平田 靖透 HIRATA, Yasuyuki 助教 Research Associate

高輝度放射光、X線自由電子レーザー、高次高調波レーザー を用いた真空紫外線~軟 X線分光・散乱実験の技術開発を行い、単原子層及び表面/界面系を中心に物性研究を行っている。

放射光施設 SPring-8 軟 X 線ビームライン BL07LSU にて 分割クロスアンジュレータの調整を行うと共に、その偏光スイッ チング特性を活かした新しい磁気光学実験法の開発を行って いる。 X 線自由電子レーザーと高次高調波レーザーによる共 鳴磁気光学効果の時間分解測定を行い、磁性超薄膜及び界 面層における超高速スピンダイナミクス研究を実施している。

SPring-8 BL07LSUではレーザーシステムも整備しており、光電子分光や X 線吸収分光の時間分解実験を共同利用として実施している。触媒反応や起電力発生などのテーマで表面・界面系におけるキャリア及び分子ダイナミクス研究が行われている。ささらに機能性単原子層の開拓も手がけ、ボロフェンやディラックノーダルラインを有した単原子層などの電子物性を明らかにしている。

光源それぞれの特性を利用してフェムト秒からミリ秒まで 各時間スケールでの動的変化をリアルタイムで追跡してその 詳細を明らかにすると共に、時系列情報をつなぎ合わせて 各動的現象の全貌も理解する研究を推進している。



高輝度軟 X 線ピームライン SPring-8 BL07LSU における放射光と超短パルスレーザー (BL07LASER) を組み合わせた時間分解光電子分光実験システムの様子。


Overview of the time-resolved photoemission system at high-brilliant soft X-ray beamline, SPring-8 BL07LSU. Synchrotron radiation pulses, generated at an undulator, pass through a monochromator that is composed of mirrors (M) and a plane-grating (PG). A Ti:Sapphire laser system (BL07LASER) is installed at the beamline.

We develop experimental techniques using vacuum ultraviolet ~ soft X-ray, generated by high brilliance synchrotron radiation, X-ray free electron laser (XFEL), and high-harmonic generation (HHG) laser, to reveal physical properties of single atomic layers and surface/interface systems.

At SPring-8 BL07LSU, we operate the segmented cross undulator and develop the novel magneto-optical experimental technique using its function of the fast polarization switching. With XFEL and a HHG laser, ultrafast spin dynamics of magnetic ultrathin films and interface layers are investigated by time-resolved measurements of the resonant magneto-optical Kerr effect.

At the time-resolved spectroscopy station in SPring-8 BL07LSU, time-resolved measurements of photoemission and X-ray absorption spectroscopy were made with laser and synchrotron radiation. Through the joint-researches of catalysis and photovoltaics, dynamics of carriers and molecules at the surface/interface are studied. We also investigate functionalities in novel monatomic layers such as borophene.

With the temporal information collected by individual light sources at each time scale, ranging from femtoseconds to milliseconds, we promote understanding of the whole dynamic picture by combining the sequential information.



フェリ磁性 GdFeCo 合金の時間分解共鳴磁気光学カー効果の実験の結果。(a) 軟 X線 FEL (hv=53 eV) でのエリプソメトリ測定のデータ(O)と三角関数でのフィッティング(実線). 赤と青のデータは互いに逆の磁場に対応している。(b) 実験結果から得られた外場 H に対する Fe の磁気モーメントの時間変化。フェムト秒の時間スケールでスピン反転が起きていることが分かる。

Time-resolved measurement of the resonant magneto-optical Kerr effect of the ferrimagnetic metallic GdFeCo alloy. (a) Experimental results (circles) of the intensity variation with rotation angle (ellipsometry) taken at hv=53 eV for soft X-ray FEL at each delay time shown in each figure with fitting by cosine curve (solid lines). Red and blue colored data were taken at the opposite directions of magnetic field. (b) A schematic diagram of the magnetization reversal dynamics of the Fe magnetic moment with respect to an external field H. The length of the arrows is scaled to the magnitude of the Kerr rotation angle at each delay time shown in (a). One can recognize reversal of the Fe spin in the femtosecond-time scale.

- 1. 時間分解軟 X 線分光実験の開発と表面ダイナミクスの研究
  Developments of time-resolved soft X-ray spectroscopy and researches on surface dynamics
- 先端軟 X 分光法による単原子層のディラック物性研究
   Dirac Fermions in monatomic layers, studied by advanced soft x-ray spectroscopy
- 3. 超短パルス軟 X 線を用いた時間分解実験の開発と超高速スピンダイナミクスの研究
  Development of time-resolved experiments using ultra-short soft X-ray pulses and researches on ultrafast spin dynamics
- 4. 次世代放射光におけるアンジュレータビームラインの先端技術開発
  Developments of frontier technologies for undulator beamlines of the next generation synchrotron radiation

https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/labs/itatani\_group.html

## 板谷研究室

Itatani Group

板谷 治郎 ITATANI, Jiro 准教授 Associate Professor




石井 順久 ISHII, Nobuhisa 助教 Research Associate



水野 智也 MIZUNO, Tomoya 特任助教 Project Research Associate


高強度極短パルスレーザーの開発と、強レーザー場下に おけるフェムト秒からアト秒領域の超高速現象に関する研究 を行っている。光源開発に関しては、可視から中赤外領域 での位相制御された高強度光電場の発生と制御、および、 原子・分子・固体における強レーザー場下での非線形現象 の探索と、その応用としてアト秒パルス発生に関する研究を 行っている。光源応用に関しては、強レーザー場やアト秒 軟 X 線パルスを用いた新規分光手法の開拓と、原子・分子・ 凝縮系における超高速現象の観測と量子制御、極端紫外か ら軟 X 線領域のアト秒短波長光を用いた超高速分光に関す る研究を行っている。位相制御された高強度極短パルスレー ザーとその波長変換を基盤技術として、テラヘルツから軟X 線にわたる広い周波数領域における光パルスの発生が可能 であるため、物質の非平衡状態における動的過程を様々な 自由度を通して実時間観測し、さらには光で制御することを 目指している。



(a)「水の窓」をカパーする高次高調波の軟 X 線スペクトル。 青線はネオン、赤線はヘリウムを非線形媒質として用いた場合を示す。(b) ヘリウムガスで発生する高次高調波スペクトルの位相依存性。この結果より、光子エネルギー 450 eV 付近で孤立アト秒パルスが発生していることがわかる。

(a) Soft-X-ray spectra of high harmonics from neon (blue curve) and helium (red curve) that cover the water window. (b) CEP dependence of the high harmonic spectra from helium. The phase-dependent structure shows the generation of isolated attosecond pulses around a photon energy of 450 eV.

Development of phase-stable intense ultrashort-pulse lasers and their applications to attosecond and strong-field physics are the main subjects of our research. As for the light source, we develop waveform-controlled intense optical pulses in IR and mid-IR spectral regions. Currently, several state-of-art IR and mid-IR sources are operational to produce high harmonics in gas or solids. For the spectroscopic applications, we develop new methods using waveform-controlled strong optical fields and attosecond pulses to explore field-induced ultrafast processes of atoms, molecules, and condensed matters. We focus on fielddriven electron dynamics and related nonlinear phenomena (e. g., high harmonic generation) in solids using intense mid-IR sources. Our methodology is based on the cutting-edge light sources and their frequency conversion that can cover the spectral range from terahertz to soft X rays with precise synchronization. We aim to use such extremely broadband and ultrafast coherent light sources for observing and controlling the quantum dynamics of non-equilibrium states of matters through various freedoms.



半導体 GaSe に高強度中赤外光を集光して得られる高次高調波のスペクトル。青線は入射光が直線偏光の場合、赤線は円偏光の場合であり、円偏光の場合、選択則が成り立つ。

High harmonic spectra from a semiconductor GaSe produced by linearly (blue curve) and circularly (red curve) polarized mid infrared light. In the case of circularly polarized input, the high harmonic spectrum obeys the selection rule.

- 高強度超短パルスレーザーの開発
   Development of intense ultrashort-pulse lasers
- 2. アト秒物理学 Attosecond physics
- 3. 原子・分子・固体における超高速現象の観測と量子制御 Ultrafast spectroscopy and coherent control of photo-induced dynamics in atoms, molecules, and solids
- 4. 固体の超高速軟 X 線分光 Soft-X-ray ultrafast spectroscopy of molecules and solid

**Laser and Synchrotron Research Center** 

https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/labs/kondo\_group.html

### 近藤研究室

Kondo Group




近藤 猛 KONDO, Takeshi 准教授 Associate Professor



黒田 健太 KURODA, Kenta 助教 Research Associate

固体中の電子状態を逆空間で描くバンド構造は、物質の あらゆる電子物性を理解する上での基礎を与える。角度分 解光電子分光は、光を物質に照射して飛び出す光電子を角 度及びエネルギーの関数としてイメージングすることでバンド 構造を可視化する強力な実験手法である。この技術をベー スとして、バンドが持つスピン構造をスピン分解によって選 り分け、さらには、パルス光で瞬間的に非平衡状態へと乱 された電子系が再び冷えて秩序化するダイナミクスをフェム ト秒スケールで観測 (時間分解) することで、多彩な電子物 性がバンド構造を通して見えてくる。当研究室では、このよ うな卓越した光電子分光技術を駆使して、非従来型の(高 温)超伝導体、遍歴と局在の狭間で織りなされる重い電子 系や電子相関系物質、強いスピン軌道相互作用に起因して 発現するトポロジカル量子相、及び固体表面や薄膜で制御 する量子井戸構造などの電気磁気物性を、直接観察で得ら れるバンド構造を舞台に研究する。さらには、ヘリウム3ク ライオスタットや極限レーザー光源を用いて、最低到達温度 及びエネルギー分解能で共に世界最高性能となる角度分解 光電子分光装置を開発し、フェルミ準位極近傍で生じる微 細な電子構造 (エネルギーギャップや素励起カップリング構 造)を解明する。

The momentum-resolved band structure provides fundamental information to understand the electronic properties of materials. The angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES) is a powerful technique to visualize the band structure by mapping the intensities of photoelectrons as a function of angle and energy. With the spin-resolved technique, we can also identify the spin-polarized character of the band. In addition, the time-resolved ARPES realized with a pump-probe technique can track the reordering process of electron system from its nonequilibrium state. In our laboratory, we utilize these various ARPES techniques and study the following phenomena: nonconventional superconductors, heavy fermions, strongly correlated systems, topological quantum phases, and quantum well states. Furthermore, we develop a new ARPES machine capable of achieving both the lowest measurement temperature and the highest energy resolution in the world by innovating a <sup>3</sup>He cryostat and a laser source. The state-of-art equipment will enable us to identify even a subtle electronic feature close to the Fermi level, such as an energy gap and a mode-coupled dispersion, which is typically tied to exotic behaviors of conduction electrons.



(a) 銅酸化物高温超伝導体  $Bi_2Sr_2CuO_{6+d}$  の結晶構造。 (b) 光電 子アナライザー。 (c) 角度分解光電子分光実験の模式図。 (d) バンド分散のスナップショット。 (e) バンド構造の全体図。 (f) フェルミ面周りで描く超伝導と擬ギャップの競合関係。 (g) 超伝導転移温度  $(T_c)$  より高温 ( 黒線) と低温 ( 赤線) で測定したフェルミ面周りのスペクトル。 ( h) ( g) で示すスペクトルの  $T_c$  上下での差分。超伝導成分が赤で塗られており、 ( f) で模式的に示す赤の領域と対応する。

(a) Crystal structure of Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CuO<sub>6+d</sub> high- $T_c$  superconductor. (b) ARPES analyzer. (c) Diagram of ARPES experiment. (d) Snapshot of dispersion image. (e) Whole band structure. (f) Competition between superconducting gap and pseudogap. (g) Spectra around Fermi surface below (red) and above (black) superconducting transition temperature ( $T_c$  = 35 K). (h) Difference between the curves in (g). Coherent spectral weight is painted with a red color, which is corresponding to the red region represented in (f).

- 極限レーザーを励起光源とする超高分解能角度分解光電子分光装置の開発 Development of a laser-excited ARPES system with ultra-high energy resolution
- 2. 角度分解・スピン分解・時間分解光電子分光で見る超伝導やトポロジカル量子相
  Superconductivity and topological quantum phase investigated by angle-, spin-, and time-resolved photoemission spectroscopy
- 3. 放射光を利用した光電子分光で研究する強相関電子系物理 Strongly correlated physics studied by photoemission with synchrotron radiation

 $https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/labs/matsunaga\_group.html$ 

### 松永研究室

Matsunaga Group




松永 隆佑 MATSUNAGA, Ryusuke 准教授 Associate Professor



神田 夏輝 KANDA, Natsuki 助教 Research Associate

テラヘルツから赤外・可視・紫外領域にわたるコヒーレン ト光源を用いて、物質の光応答と、光電場によって物質中 に誘起される非平衡状態の性質を調べる。特にテラヘルツ 周波数帯はフォトンエネルギーで数 meV 程度に相当し、物 性物理学において重要なフェルミ面近傍の電磁気応答を通 して物質中の素励起を探る有効な手法となっている。さらに 近年開発された極めて高い電場尖頭値を持つ高強度テラへ ルツ波を駆使することで、余剰エネルギーを与えることなく 低エネルギーの素励起を共鳴的に強く励起する、あるいは 物質中の素励起よりもさらにエネルギーの低い光電場による 非共鳴的励起によってコヒーレントな相互作用を調べること が可能になる。テラヘルツ発生及び検出技術と非線形分光 測定手法を開発するとともに、超伝導や反強磁性のような 多体系の秩序に現れる集団励起、非線形応答や非平衡状 態でのみ現れる物質の新たな状態を調べ、その機能性を明 らかにする。

We investigate light-matter interactions and light-induced nonequilibrium phenomena in materials by utilizing terahertz wave, infrared, visible, and ultraviolet coherent light sources based on ultrafast pulsed laser technology. Especially terahertz spectroscopy can unveil low-energy responses of materials on the order of millielectronvolts which include essential information for dynamical motions of electron, phonon, or spin degrees of freedom in condensed matter physics. Recentlydeveloped intense terahertz pulse generation technique has also opened a new pathway toward optical control of materials by strong resonant or off-resonant excitation. In addition to the development of terahertz generation and detection technique and novel nonlinear spectroscopy scheme, we will contribute on the study for cooperative behaviors in many-body systems like superconductivity or antiferromagnetism and seek hidden transient phases of matters in nonequilibrium system to reveal the functionality of materials.



高強度テラヘルツパルス発生および位相安定中赤外パルス発生に用いるフェムト秒 再生増幅パルスレーザーシステム

Regenerative-amplified femtosecond pulse laser system for intense terahertz wave generation and phase-locked mid-infrared light generation



テラヘルツ電磁応答および Hall 伝導測定に用いる透過・反射・偏光回転精密計測 システム

Transmission, reflection, and polarization rotation spectroscopy system for terahertz electromagnetic response and Hall conductivity measurements

- 高強度位相安定テラヘルツ 中赤外パルス光源開発、検出技術開発
   Development of intense, phase-locked terahertz-mid infrared pulse generation and detection
- 2. 超伝導や反強磁性における線形・非線形な電磁応答と集団励起の解明 Study of collective excitations and response functions in superconductivity and antiferromagnetism
- 3. 光電場で強励起された非平衡多体系の超高速ダイナミクスの研究 Nonequilibrium dynamics of many-body systems driven by strong light field

Laser and Synchrotron Research Center

https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/labs/okazaki\_group.html


### 岡崎研究室

Okazaki Group



岡﨑 浩三 OKAZAKI, Kozo 准教授 Associate Professor


角度分解光電子分光は物質中の電子の運動量とエネル ギーの分散関係 (バンド構造)を直接観測できる強力な実 験手法であるが、フェムト秒レーザーをポンプ光、その高 次高調波をプローブ光として用いることで、非平衡状態にお けるバンド構造の超高速過渡特性も観測できるようになる。 本研究室では、レーザー開発の研究室と共同で超短パルス 高次高調波レーザーを用いた時間分解光電子分光装置の 開発・改良を進め、ポンプ・プローブ時間分解光電子分光 によって、光励起状態からの電子の緩和過程の直接観測、 光誘起相転移に伴う電子状態の変化の直接観測等を行い、 励起状態からの電子の緩和機構の解明や光誘起超伝導の 直接観測による実証を目指している。また、エネルギー分 解能 70 μeV、最低測定温度 1 K という世界最高性能を有 するレーザー角度分解光電子分光装置を用いて、非従来型 超伝導体の電子構造、超伝導ギャップ構造を直接観測する ことで非従来型超伝導の機構解明を目指している。



高次高調波レーザーを用いた時間分解光電子分光装置の概略図

Schematic diagram of a time-resolved photoemission apparatus utilizing a femtosecond laser and its high harmonic generation.

Angle-resolved photoemission spectroscopy is a very powerful experimental technique that can directly observe a dispersion relation between momentum and energy (band structure) of the electrons in solid-state materials, whereas by utilizing a femtosecond laser as pumping light and its high harmonic generation (HHG) as probing light, we can observe ultrafast transient properties of the band structure in a non-equilibrium state. In our group, we are developing and improving a time-resolved photoemission apparatus that utilizes high harmonic generation of an ultrashort-pulse laser in collaboration with laser development groups, and aiming for understanding the mechanisms of electron relaxation dynamics from photo-excited states and demonstration of photo-induced superconductivity by direct observations of transient electronic states using pump-probe type time-resolved photoemission spectroscopy (TRPES). In addition, we are aiming for understanding the mechanisms of unconventional superconductivity by direct observations of the electronic structures and superconducting-gap structures of unconventional superconductors with a laser-based angleresolved photoemission apparatus with a world-record performance that achieves a maximum energy resolution of 70  $\mu eV$ and lowest cooling temperature of 1 K.



高次高調波レーザー時間分解光電子分光で観測された励起子絶縁体  $Ta_2NiSe_5$  における光誘起絶縁体 - 金属転移 a, b はそれぞれ、光励起前、光励起後のスペクトル

Photo-induced insulator-to-metal transition in an excitonic insulator Ta<sub>2</sub>NiSe<sub>5</sub> observed by HHG laser TRPES. a, b. Spectra before and after pump, respectively.

- 1. 高次高調波レーザーを用いた時間分解光電子分光装置の開発
  Development of a time-resolved photoemission apparatus utilizing high harmonic generation from a ultrashort-pulse laser
- 2. 光励起状態からの物質中の電子の緩和機構の解明、光誘起超伝導の直接観測 Mechanisms of electron relaxation from photo-excited states and light-induced superconductivity
- 3. 極低温超高分解能レーザー角度分解光電子分光による非従来型超伝導体の機構解明 Mechanisms of unconventional superconductivities by ultralow temperature and ultrahigh resolution laser-based angle-resolved photoemission spectroscopy

## 新部研究室

Niibe Group



新部 正人 NIIBE, Masahito 客員准教授 Visiting Associate Professor

ニュースバル放射光施設 (兵庫県立大学) を研究拠点として、光子エネルギー750 eV 以下の軟 X線領域での吸収分光 (XAS) および発光分光 (XES) の装置開発と、それを用いた種々の物質の分光学的評価・研究を行っている。

XAS は物質の非占有電子状態 (固体の伝導帯)を、また XES は占有電子状態 (価電子帯)を反映したスペクトルを 得ることができ、固体物性の研究には極めて有用なツールである。エネルギー750 eV 以下の光子は、B, C, N, O, F, Al, Si, P, S など、物質を構成する主要な軽元素や、3d 遷移金属の内殻励起に用いられ、固体物性を理解するための 重要な情報が得られる。我々は松田巌研究室との共同研究により、ディラックノーダルループ (DNL)を持つと期待される新規の2D 物質である6 員環および5-7 員環の単原子層 Bシートについて、XAS, XESを測定し、理論解析と合わせてその物性の解明を進めている。さらに、厚さ100 nm の自立薄膜を圧力隔壁とした He パスによる大気圧下軟 X 線 XAS / XES 装置の開発も進めている。

With the NewSUBARU synchrotron radiation facility (University of Hyogo) as a research base, we are developing X-ray absorption spectroscopy (XAS) and emission spectroscopy (XES) equipment in the soft X-ray region with photon energy of 750 eV or less, and using it, conducting spectroscopic evaluation and research of various materials.

XAS can obtain a spectrum reflecting unoccupied electronic states of a substance (conduction band in solid), and XES can obtain the occupied electronic state (valence band), which are extremely useful tools for studying solid state physics. Photons with energy less than 750 eV are used for the inner shell excitation of major light elements such as B, C, N, O, F, Al, Si, P, and S, and 3d transition metals. It provides important information for understanding properties of solids. We have collaborated with I. Matsuda Laboratory on 6-membered and 5-7-membered honeycomb monolayer B sheets that are expected to have Diracnodal loops (DNL). We are measuring XAS and XES spectra of the B sheets and elucidating its physical properties along with theoretical analysis. We are also developing a soft X-ray XAS/XES system under atmospheric pressure using a He-path with a 100 nm thick free-standing membrane as a pressure partition.

### 軌道放射物性研究施設 / 播磨分室 Synchrotron Radiation Laboratory / Harima Branch

https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/labs/sor/index.html

教授(施設長)原田 慈久 Professor(Director): HARADA, Yoshihisa 教授(副施設長) 小森 文夫 Professor(Deputy Director):KOMORI, Fumio 授 松田 巌 Associate Professor: MATSUDA, Iwao 授 近藤 猛 Associate Professor: KONDO, Takeshi 准教授(客員) 新部 正人 Visiting Associate Professor: NIIBE, Masahito 助 教 山本 達 Research Associate: YAMAMOTO, Susumu 教 矢治 光一郎 Research Associate : YAJI, Koichiro 助 助 宮脇 淳 Research Associate: MIYAWAKI, Jun 平田 靖透 Research Associate: HIRATA, Yasuyuki 原沢 あゆみ Technical Associate: HARASAWA, Ayumi 技術専門員 技術専門職員 澁谷 Technical Associate: SHIBUYA, Takashi

軌道放射物性研究施設 (SOR 施設) は高輝度放射光を 利用した先端的物性研究や新しい実験技術の開発・研究を 共同で行っている。SPring-8 に設置された播磨分室では、 同放射光施設に世界最高性能の高速偏光スイッチング軟X 線アンジュレータビームライン (東京大学放射光アウトステー ション物質科学ビームライン BL07LSU) を整備し、高輝度 軟X線放射光を利用する最先端の物性科学研究を推進して いる。播磨分室スタッフは、先端軟 X 線分光技術の開発と 新物質・新材料の電子状態研究を行うために、時間分解軟 X線分光実験ステーション、高分解能軟 X 線発光分光ス テーション、3次元ナノエスカステーション、軟 X線磁気光 学カー効果ステーション、軟 X 線回折ステーションを立ち上 げ、全国共同利用だけでなく、海外からの共同利用も受け 付けている。一方、柏のE棟においては、レーザーグルー プとの共同研究の基に、真空紫外・軟 X 線レーザー光源を 用いた超高分解能スピン偏極光電子分光装置を建設し、全 国共同利用に提供している。



SPring-8 BL07LSU の 8 台の Figure-8 アンジュレーター。本挿入光源より連続偏角可変型不等間隔刻線平面回折格子分光器を経て、各実験ステーションに高輝度軟 X 線が供給される。

Figure-8 undulators installed in SPring-8, which provide high-brilliance synchrotron radiation soft X-rays into the beamline BL07LSU.

技術専門職員 工藤 博文 昭子 学術支援職員 福島 研究支援推進員 藤澤 正美 特任研究員 赤田 圭史 特任研究員 エル ムサウイ スリマン 特任研究員 大平 猛 特任研究員 尾嶋 正治 倉橋 直也 特任研究員 特任研究員 張 文雄 特任研究員 山神 光平 特任研究員 山添 康介

Technical Associate: KUDO, Hirofumi
Technical Associate: FUKUSHIMA, Akiko
Technical Staff: FUJISAWA, Masami
Project Researcher: AKADA, Keishi
Project Researcher: EL Moussaoui, Souliman
Project Researcher: OHDAIRA, Takeshi
Project Researcher: KURAHASHI, Naoya
Project Researcher: ZHANG, Wenxiong
Project Researcher: YAMAGAMI, Kohei
Project Researcher: YAMAZOE, Kosuke



矢治 光一郎 YAJI, Koichiro

The synchrotron radiation laboratory(SRL) is promoting advanced spectroscopy using synchrotron radiation in soft X-ray and vacuum ultraviolet region. SRL operates a branch laboratory at SPring-8 to maintain the high-brilliance soft X-ray beamline BL07LSU of the University of Tokyo, where time-resolved soft X-ray spectroscopy, high-resolution soft X-ray emission spectroscopy, 3D (depth + 2D microscopy) nanoESCA, X-ray magneto-optical effect, and soft X-ray diffraction are utilized to study electronic states and dynamics in new materials. SRL developed the fast polarization switching of the undulator light source in cooperation with SPring-8. In the building E at Kashiwa campus, SRL developed the ultra-high resolution spin-resolved photoemission spectroscopy using vacuum ultraviolet and soft X-ray lasers in collaboration with laser light source scientists in ISSP.



E 棟における高効率スピン VLEED 検出器を備えたレーザー励起高分解能電子分光 装置。

A laser-excited spin-resolved photoemission spectrometer with VLEED spin detector, which enables us to measure spectra with very high energy and momentum resolutions.